Efremovsky

Vass8R03s171-175

Collection Vassal-Montpellier

ulantandantandantandantand

OMtp332

Efremousky Cl8 R3 > 171-175





doctorbutodoctorbutod





douted and a dealer trade

<u>luutuuluuti</u>ndootiotioti

NOM Efremouky

<u>Inntroduction to design t</u>

EMPLACEMENT 8 R3 s171. 175

dintroductorductorductord

Souche	Nbre yeux	rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Fl début	oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
2 3 4 5	3 4 5 4 4	23.3 23.3 27.3 27.3	0 1 5 5			7.6	10.6 10.6	3.8	6.8	10,8	149
	16	25,3	M !	6,5		7.6			Port Vigu	mei m 3	rge

ANNEE 1988
NOM Efremarsky bl EMPLACEMENT 8 R3 1 171. 175

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb			F1 début	oraiso mi/f		Vé début	raison mi/v	fin	Maturité		
1 f 2 3 4	3 2 3		21.3	2 6 3	15	31.5	3 .6	<i>C</i> 6	28.7		4.8	5-9,88		
		1	9. 7	1			3,6	1		+21		+3		
			21.3		+3									
Pourriture : O Port : Millinge								Vigueur: 3 moyenne						

ANNEE 1989
NOM Efremovsky & EMPLACEMENT 8 R3 S 17L 175
ni

doutonhoutonhoutonh

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raisor mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
2 3 4 5 8	4	8.3	13.3.		8,3	20.5	24.5 24.5 -3	30 (£4.7	5.8	No.8	28,8
Pourriture: 0 Mill.: Port: mi suge Vigueur: 3,5												

N° d'ordre :

Désignation : Efreweity
Emplacement : cl 8 k3 s tH-175 (s 143)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (82) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux (90) - sans villosité pubescente (278) - sans villosité laineuse 279.

Blanc (3) fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivnées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

ulantaalaataalaataalaataal

Etallées - en gouttière - autres.

Juntum luntu

Pace inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente (280) - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 2034 fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas cû la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 20me et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 219 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 238.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calus 86

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

Vrille

Juntum luntu

Efrenousky 8 R3s. 171-175 (173)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243, poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 24792 duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 25) - à raies 252 - vert 253. : dos coloré 25) - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - movenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265). Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Désignation : Emplacement :

N° d'ordre :

Juntanlanta

Efrenovsky 8 R30-171-175 (0,172)

duntadantadantadantad

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

partiel[ement - totalement.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté araneeux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273. limbe: glabre 150 - séteux 1/51 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité

laineuse 275. Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan en gouttière - involuté - révolutes tourmenté. Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 169 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 173 - séteux [7] - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

Calvo 86

Efrenouky 8 R3 s, 171. 175 (4.173) N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Juntanlanta

dantadantadantadantad

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite ((dimensions x Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (73) A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long (76) A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté (18) - aoûté jusqu'à la première

ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81)

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 20 x 19). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme: discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore (05) - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129

A pinceau : court 130 - moyen 131) - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine (35) - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse (39 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 88

Efrem ovoky 8 R3 & 194. 175 (n-3)

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

nlantanlantanlantanlantaal

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).

: entierement (7) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 12.... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - efface (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2))rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvorb

N° d'ordre : Désignation : E premovsky Emplacement : 8 k3 s 171. 175

Luntumlanda

```
: 1 - 2 - 3
: 4 - 5 - 6
Angle des nervures
Sexe
                                  : 7 - 8 - 9
L1/L2
                                  : 10 - (11)
                               : 10 - (11)
: 12 - (13) - (14) - 15 - 16
L2/L
Nombre de lobes
                            : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                           : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                              : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                   : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                   : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270
                                  : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                   : (40) - 41
Dents : forme
                                   : (42) - (43) - 44
Dents (angle)
                                   : (45) - (46) - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                                   : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                   : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 90

doutonhoutonlootonhoutonl